

VALUTAZIONE DELL' EFFICACIA DI UNA SETA MEDICATA NEL TRATTAMENTO DELLA DERMATITE ATOPICA IN BAMBINI ED ADULTI

Fabio PICCIRILLO, Silvia BONDINO, Anna TRINK, Vincenzo Claudio BATTARRA*, Giuseppe STINCO

Clinica Dermatologica - Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Udine

* UOSD Dermatologia Oncologica Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano Caserta



OBIETTIVI DELLO STUDIO

Confrontare l'efficacia e la tollerabilità della seta medicata Dermasilk® nel Trattamento della DA nei bambini ed adolescenti/adulti.

MATERIALI E METODI

- Studio in aperto
- Durata dello studio: 4 settimane
- Criterio cardine di inclusione: dermatite atopica in fase attiva con lesioni localizzate agli arti superiori
- In totale sono stati arruolati 70 pazienti:
 - 35 di età ≤ 16 (8 ± 5.4): GRUPPO A
 - 35 di età > 16 (18 ± 11.6): GRUPPO B
- Valutazione dei risultati al tempo 0 (T0), 7 (T7), 14 (T14), 21 (T21) e 28 (T28) giorni mediante:
 - Foto
 - L'obiettività cutanea e la sintomatologia soggettiva utilizzando lo SCORAD index modificato, adattato per la valutazione dei soli arti superiori (ognuno ha una superficie espressa in percentuale pari al 100%)
 - Scala VAS per prurito di 10 cm di lunghezza
- Durante lo studio era consentito l'utilizzo di crema base
- Non era consentito l'utilizzo di topici cortisonici, topici anticalcineurinici (tacrolimus e pimecrolimus) e/o l'assunzione di antistaminici

RISULTATI



GRUPPO A: T28-T0= 18.6 ± 14.18 ($p < 0.0001$)
 GRUPPO B: T28-T0= 21.61 ± 19.5 ($p < 0.0001$)

La differenza dei miglioramenti tra i 2 gruppi non è risultata statisticamente significativa ($p = 0.21$)

GRUPPO A: T28-T0= 2.96 ± 1.66 ($p < 0.0001$)
 GRUPPO B: T28-T0= 3.57 ± 2.31 ($p < 0.0001$)

La differenza dei miglioramenti tra i 2 gruppi non è risultata statisticamente significativa ($p = 0.3$)

CONCLUSIONI

- Numerosi studi hanno evidenziato che la seta medicata DermaSilk si è rivelata efficace nel trattamento della DA dei BAMBINI e nel controllo della sintomatologia pruriginosa ad essa associata
- Il nostro studio ha mostrato che la seta medicata risulta un utile presidio terapeutico anche nel trattamento della DA degli ADULTI
- SCORAD e VAS del prurito sono migliorati in misura maggiore, anche se senza significatività statistica, nell'adulto rispetto al bambino.